

Preventivní ošetření paznehtů

Pro běžnou preventivní péči připravte pracovní roztok o koncentraci **3–8 %**.

Roztok aplikujte:

- do koupacích van,
- na dezinfekční rohože.

Doporučuje se výměna roztoku po průchodu přibližně 200 kusů skotu. Při silném znečištění je vhodné roztok vyměnit dříve.

Pro dlouhodobou prevenci doporučujeme koupání minimálně 2× měsíčně.

Ošetření při zvýšeném výskytu onemocnění paznehtů

Při zvýšeném výskytu onemocnění paznehtů připravte pracovní roztok o koncentraci **5 %**.

Doporučený postup:

1. Provádějte koupel po dobu 5 po sobě jdoucích dnů.
2. Následně snižte koncentraci na běžnou preventivní úroveň (3 %).
3. Pokračujte v pravidelném preventivním režimu.

Lokální ošetření postřikem

Pro lokální aplikaci použijte **10% roztok**.

Postup:

1. Paznehty důkladně očistěte.
2. Pomocí ručního postřikovače aplikujte roztok na postižená místa.
3. Následně pokračujte v pravidelném režimu koupelí.

Dezinfekce stájových prostor

Přípravek lze použít také k dezinfekci:

- průchozích cest,
- prostor kolem dojírny,
- stájových ploch a povrchů,
- míst s vyšším výskytem mikroorganismů.

Pro dezinfekci povrchů se používá **3% pracovní roztok**, který se aplikuje postřikem na očištěný povrch.

Aplikaci provádějte bez přítomnosti zvířat.

Doba působení

Doporučená doba expozice je **30 minut nebo do úplného zaschnutí přípravku**.

Podrobné informace o bezpečné manipulaci naleznete v aktuálním bezpečnostním listu produktu.