

Způsob použití

Varianta 1 – Textilní utěrky

Připravte přibližně **5% pracovní roztok**.

Textilní utěrky namáčejte v připraveném roztoku a používejte k očištění a dezinfekci struků před dojením.

Varianta 2 – Pěnová aplikace

Připravte roztok v poměru:

1 díl přípravku : 4 díly vody

Roztok nalijte do pěnového aplikátoru a vytvořte pěnu.

Pěnu naneste na struky a následně je důkladně otřete jednorázovou papírovou utěrkou.

Varianta 3 – Papírové utěrky (mokrý cesta)

Připravte smáčecí roztok o koncentraci:

0,8–1 %

Roli papírových utěrek vložte do dávkovací nádoby o objemu přibližně 3 litry.

Aplikujte 1–2 dávky pomocí dávkovací pumpy a nechte utěrky nasáknout po dobu **2–3 hodin**.

Takto připravené utěrky lze používat až **3 dny**, poté doporučujeme připravit nový roztok.

Doporučený postup před dojením

1. Odstříkněte první stříky mléka do samostatné nádoby.
2. Očistěte a dezinfikujte struky pomocí FaSy Pre-Dip Iodine New.
3. Nechte přípravek krátce působit.
4. Před nasazením dojící soupravy důkladně osušte struky čistou jednorázovou utěrkou.
5. Zahajte dojení.

Důkladné osušení struků před dojením je nezbytné pro zachování kvality mléka.

Skladování

- Chraňte před mrazem.
- Nevystavujte vysokým teplotám.
- Uchovávejte v originálním uzavřeném obalu.
- Skladujte na suchém a chladném místě.

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby.